



中华人民共和国国家标准

GB/T 14926.1~14926.6—2001
GB/T 14926.8~14926.17—2001
GB/T 14926.41—2001
GB/T 14926.44~14926.49—2001

实验动物 微生物学检测方法(2)

Laboratory animal—Microbiological examination methods

2001-08-29 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 录

GB/T 14926.1—2001	实验动物	沙门菌检测方法	1
GB/T 14926.2—2001	实验动物	单核细胞增生性李斯特杆菌检测方法	5
GB/T 14926.3—2001	实验动物	耶尔森菌检测方法	9
GB/T 14926.4—2001	实验动物	皮肤病原真菌检测方法	13
GB/T 14926.5—2001	实验动物	多杀巴斯德杆菌检测方法	17
GB/T 14926.6—2001	实验动物	支气管鲍特杆菌检测方法	21
GB/T 14926.8—2001	实验动物	支原体检测方法	25
GB/T 14926.9—2001	实验动物	鼠棒状杆菌检测方法	30
GB/T 14926.10—2001	实验动物	泰泽病原体检测方法	34
GB/T 14926.11—2001	实验动物	大肠埃希菌 0115a,c,K(B)检测方法	39
GB/T 14926.12—2001	实验动物	嗜肺巴斯德杆菌检测方法	42
GB/T 14926.13—2001	实验动物	肺炎克雷伯杆菌检测方法	46
GB/T 14926.14—2001	实验动物	金黄色葡萄球菌检测方法	50
GB/T 14926.15—2001	实验动物	肺炎链球菌检测方法	54
GB/T 14926.16—2001	实验动物	乙型溶血性链球菌检测方法	58
GB/T 14926.17—2001	实验动物	绿脓杆菌检测方法	62
GB/T 14926.41—2001	实验动物	无菌动物生活环境及粪便标本的检测方法	66
GB/T 14926.44—2001	实验动物	念珠状链杆菌检测方法	69
GB/T 14926.45—2001	实验动物	布鲁杆菌检测方法	73
GB/T 14926.46—2001	实验动物	钩端螺旋体检测方法	78
GB/T 14926.47—2001	实验动物	志贺菌检测方法	83
GB/T 14926.48—2001	实验动物	结核分枝杆菌检测方法	87
GB/T 14926.49—2001	实验动物	空肠弯曲杆菌检测方法	90

前 言

本标准是对 GB/T 14926.9—1994《实验动物 鼠棒状杆菌检验方法》的修订。

本标准增加了血清玻片凝集试验。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出并归口。

本标准起草单位：中国实验动物学会。

本标准主要起草人：李红。

本标准于 1994 年 1 月首次发布。

中华人民共和国国家标准

实验动物 鼠棒状杆菌检测方法

Laboratory animal—Method for examination of
Corynebacterium kutscheri

GB/T 14926.9—2001

代替 GB/T 14926.9—1994

1 范围

本标准规定了实验动物鼠棒状杆菌的检测方法。
本标准适用于小鼠和大鼠鼠棒状杆菌的检测。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14926.42—2001 实验动物 细菌学检测 标本采集

GB/T 14926.43—2001 实验动物 细菌学检测 染色法、培养基和试剂

3 原理

鼠棒状杆菌为革兰阳性小杆菌,主要寄居于小鼠和大鼠的上呼吸道,于血琼脂平皿上形成特殊的菌落形态,具有独特的生化反应,菌体可与相应的免疫血清在玻片上形成肉眼可见的凝集反应,据此可进行分离培养和检测。


4 主要设备和材料

- 4.1 普通恒温培养箱。
- 4.2 生物显微镜。

5 培养基和试剂

- 5.1 血琼脂平皿。
- 5.2 硝酸盐还原试验培养基。
- 5.3 糖发酵培养基。
- 5.4 尿素培养基。
- 5.5 营养明胶。
- 5.6 鼠棒状杆菌诊断血清。

6 检测程序



7 操作步骤

7.1 采样

采取呼吸道分泌物或病灶分泌物或脓汁。

7.2 分离培养

将已接种的血琼脂平皿置 $(36\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 培养24~48 h。

7.3 鉴定

7.3.1 菌落特征

本菌在血琼脂平皿上 $(36\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 培养24~48 h可形成1 mm左右、白色、突起、无光泽、触之较硬、涂片不易乳化、不溶血的菌落。

7.3.2 菌体特征

革兰阳性小杆菌，呈棒锤状或微弯曲，排列不规则，可散在或成对或呈“V”形或呈栅栏状排列。

7.3.3 生化反应

分解葡萄糖、蔗糖、麦芽糖和甘露糖，产酸不产气；不分解甘露醇、乳糖；尿素酶阳性；液化明胶；硝酸

盐还原试验阳性。

7.3.4 血清玻片凝集试验阳性。

8 结果报告

凡符合上述各项检测结果者作出阳性报告,不符合者作出阴性报告。
